


Manejo y alimentación ovinos según las etapas fisiológicas



¿Que es manejo?



- Es el conjunto de prácticas técnicas, administrativas y operativas aplicadas de manera planificada sobre un rebaño de ovejas.

Preparación para monta

- ☐ Flushing
- ☐ Vitaminas
- ☐ Desparasitantes
- ☐ Corte Pezuña



Flushing

El flushing consiste en aumentar la alimentación energética de los rumiantes reproductores, especialmente en las hembras, un mes antes del servicio.

Este aumento tiene como objetivo mejorar el peso corporal, la tasa de ovulación y con suerte, el tamaño de la camada.

*Qué es el flushing en bovinos y cómo implementarlo | CONtexto Ganadero. (2024, 22 febrero). CONtexto Ganadero.
<https://www.contextoganadero.com/ganaderia-sostenible/que-es-el-flushing-en-bovinos-y-como-implementarlo>*




Preparación del semental

Evaluación física



Preparación del semental

Evaluación del semen



Primera Etapa De Gestación

Día 0 hasta día 50

Alimentación de
Mantenimiento



Segunda Etapa de Gestación

Desde 50 a 100 días

De 50 a 65 días

- ❖ Confirmación de preñes
- ❖ Corte de pezuñas
- ❖ Vitaminas



Segunda etapa de Gestación

Desde 50 a 100 días

De 65 a 100 Días


- Vacunas
- Selenio
- Desparasitación



Tercera etapa de gestación

Desde 100 días a 150

❖ Mejora de la Alimentación



Manejo De La Madre Al Parto

- ❖ Registro
- ❖ Desparasitación
- ❖ Revisión de ubre



Cría


- ❖ Calostro
- ❖ Limpieza de ombligo
- ❖ Pesaje
- ❖ Identificación



Calostro

Los corderos nacen sin anticuerpos y requieren recibirlos de su madre a través del calostro en las primeras horas de vida,

ya que su capacidad para absorberlos disminuye rápidamente después del nacimiento.



Limpieza De Ombligo

Se sugiere tratar los cordones umbilicales de corderos y cabritos al nacer con una solución umbilical para promover un inicio saludable y prevenir enfermedades umbilicales.



Pesaje y Identificación

Identificación por medio de :

- ◆ Chips
- ◆ Tatuaje
- ◆ Artes



Etapas de la cría

Día 0 – Día 30

Día 0 – Día 60 o más.



Etapas de la cría (de 0 -30 días)

Enfermedades comunes

- ☐ Coccidia
- ☐ Onfalitis
- ☐ Deficiencia de selenio

Creep Feeding (separador)



Día de 30 -60 o más

Vacunas



Enfermedades en etapa de 30 a 60 días

- ❖ Parásitos
- ❖ Quero conjuntivitis
- ❖ Estima contagioso
- ❖ Problemas respiratorios
- ❖ Urolitiasis
- ❖ Deficiencia de selenio



Querato Conjuntivitis

Es una enfermedad infecciosa que causa inflamación en dos partes clave del ojo.

Córnea Capa transparente que protege el ojo y regula la entrada de luz.

Conjuntiva: Tejido que rodea el globo ocular y los párpados.



Estigma contagioso



Lactancia

- Lactancia corta 60 días
- Lactancia Larga 90 días



Levante



La etapa de levante en ovejas hembras (destinadas a reproducción) es la fase posterior al destete donde se busca un crecimiento óptimo mediante manejo nutricional, sanitario y cuidados específicos hasta alcanzar el peso y edad adecuados para su venta o reproducción

El ganado de levante | Fedegán. (s. f.).
<https://www.fedegan.org.co/el-ganado-de-levante>

Levante 2 meses 6 meses

- ◆ Desparasitación
- ◆ Corte de pezuñas
- ◆ Aplicación de selenio
- ◆ alimentación



Levante de 6 meses a mas

- ❑ Desparasitación
- ❑ Aplicación de selenio
- ❑ Corte de pezuñas
- ❑ Otras vitaminas



Ceba

❖ Etapa 1

❖ Etapa 2



Etapas 1

Corderos de 19kg hasta 37 kg



Etapa 2

Corderos De 37 kg y más.



Enfermedades mas comunes en etapa de ceba

- ❖ Urolitiasis
- ❖ Querato conjuntivitis
- ❖ Problemas respiratorios
(físicos o patógenos)
- ❖ Problemas ruminales
(físicos o patógenos)



Gracias por su atención

